



おしどり相談

昔は梅毒と淋病にかかつたが最後、殆んど治と考えられていました。しかし医学の進歩に従つて、次第に治療の完全が期待されるようになりました。

梅毒の治療には、砒素剤と蒼鉛剤が必要でした。ご存じのエ

レリッヒと桑佐八郎博士とに

よつて発見されたサルバルサン

は、非常に効果的で、第一期梅毒では、局所に初期確

結があるが、ワッセルマン反応

はまだ陽性になつてないよう

な早期に治療すれば、非常に早

くかつ完全に治まるのですこれが

第三期または慢性梅毒と云つて、次第に治療の完全が期待されると、完全に治すことほどあ

ります。

本来、化学療法によって薬剤を

用いて病原菌を殺す治療法の

本原理は、身体を傷めない範囲

まで大量の薬を短期間に用いて、ため、たゞ熱心さの点で医者と

患者が一致してからねばなら

ません。

そこでこの法则に従つて、ホフ

も第一期梅毒で、局所に初期確

結があるが、ワッセルマン反応

はまだ陽性になつてないよう

のが、サルバルサンよりも副作

用が少くて有効なことからわたり

最近は、砒素剤でマーファンゼン

またはマーフアルゾールといふ

ものが、サルバルサンよりも副作

用が少くて有効なことからわたり

最近は、砒素剤でマーファンゼン

またはマーフアルゾールといふ

ものが、ベニシリンが梅毒の

治療に有効なことが明らかにさ

れ、大量を短期間に用いても副

作用なく、非常に便利なことが

わからました。ことに過去にお

使ひ、かつ蒼鉛剤を併用して

標めてよい結果を得ています。

しかし、この方法によつて副作用

と費用がかかるとの欠点の

あります。

そこでこの法则に従つて、ホフ

も第一期梅毒で、局所に初期確

結があるが、ワッセルマン反応

はまだ陽性になつてないよう

のが、サルバルサンよりも副作

用が少くて有効なことからわたり

最近は、砒素剤でマーファンゼン

またはマーフアルゾールといふ

ものが、ベニシリンが梅毒の

治療に有効なことが明らかにさ

れ、大量を短期間に用いても副

作用なく、非常に便利なことが

わからました。ことに過去にお

使ひ、かつ蒼鉛剤を併用して

標めてよい結果を得ています。

しかし、この方法によつて副作用

と費用がかかるとの欠点の

あります。

そこでこの法则に従つて、ホフ

も第一期梅毒で、局所に初期確

結があるが、ワッセルマン反応

はまだ陽性になつてないよう

のが、サルバルサンよりも副作

用が少くて有効なことからわたり

最近は、砒素剤でマーファンゼン

またはマーフアルゾールといふ

ものが、ベニシリンが梅毒の

治療に有効なことが明らかにさ

れ、大量を短期間に用いても副

作用なく、非常に便利なことが

わからました。ことに過去にお

使ひ、かつ蒼鉛剤を併用して

標めてよい結果を得ています。

しかし、この方法によつて副作用

と費用がかかるとの欠点の

あります。

そこでこの法则に従つて、ホフ

も第一期梅毒で、局所に初期確

結があるが、ワッセルマン反応

はまだ陽性になつてないよう

のが、サルバルサンよりも副作

用が少くて有効なことからわたり

最近は、砒素剤でマーファンゼン

またはマーフアルゾールといふ

ものが、ベニシリンが梅毒の

治療に有効なことが明らかにさ

れ、大量を短期間に用いても副

作用なく、非常に便利なことが

わからました。ことに過去にお

使ひ、かつ蒼鉛剤を併用して

標めてよい結果を得ています。

しかし、この方法によつて副作用

と費用がかかるとの欠点の

あります。

そこでこの法则に従つて、ホフ

も第一期梅毒で、局所に初期確

結があるが、ワッセルマン反応

はまだ陽性になつてないよう

のが、サルバルサンよりも副作

用が少くて有効なことからわたり

最近は、砒素剤でマーファンゼン

またはマーフアルゾールといふ

ものが、ベニシリンが梅毒の

治療に有効なことが明らかにさ

れ、大量を短期間に用いても副

作用なく、非常に便利なことが

わからました。ことに過去にお

使ひ、かつ蒼鉛剤を併用して

標めてよい結果を得ています。

しかし、この方法によつて副作用

と費用がかかるとの欠点の

あります。

そこでこの法则に従つて、ホフ

も第一期梅毒で、局所に初期確

結があるが、ワッセルマン反応

はまだ陽性になつてないよう

のが、サルバルサンよりも副作

用が少くて有効なことからわたり

最近は、砒素剤でマーファンゼン

またはマーフアルゾールといふ

ものが、ベニシリンが梅毒の

治療に有効なことが明らかにさ

れ、大量を短期間に用いても副

作用なく、非常に便利なことが

わからました。ことに過去にお

使ひ、かつ蒼鉛剤を併用して

標めてよい結果を得ています。

しかし、この方法によつて副作用

と費用がかかるとの欠点の

あります。

そこでこの法则に従つて、ホフ

も第一期梅毒で、局所に初期確

結があるが、ワッセルマン反応

はまだ陽性になつてないよう

のが、サルバルサンよりも副作

用が少くて有効なことからわたり

最近は、砒素剤でマーファンゼン

またはマーフアルゾールといふ

ものが、ベニシリンが梅毒の

治療に有効なことが明らかにさ

れ、大量を短期間に用いても副

作用なく、非常に便利なことが

わからました。ことに過去にお

使ひ、かつ蒼鉛剤を併用して

標めてよい結果を得ています。

しかし、この方法によつて副作用

と費用がかかるとの欠点の

あります。

そこでこの法则に従つて、ホフ

も第一期梅毒で、局所に初期確

結があるが、ワッセルマン反応

はまだ陽性になつてないよう

のが、サルバルサンよりも副作

用が少くて有効なことからわたり

最近は、砒素剤でマーファンゼン

またはマーフアルゾールといふ

ものが、ベニシリンが梅毒の

治療に有効なことが明らかにさ

れ、大量を短期間に用いても副

作用なく、非常に便利なことが

わからました。ことに過去にお

使ひ、かつ蒼鉛剤を併用して

標めてよい結果を得ています。

しかし、この方法によつて副作用

と費用がかかるとの欠点の

あります。

そこでこの法则に従つて、ホフ

も第一期梅毒で、

