



# 発育十日おくれる 病虫害対策本部で啓蒙

病虫害対策本部で啓蒙

農業雨や豪雨のあと本格的な夏型天候に入つたが、これがひがみ水稲に病虫害の多発する季節に入る。

田中、水稲を邊れている水稻を、この好天候で回復させなければならない。それでも平年位には心配だと石城地方病虫害対策本部では「病害をかりて、三十日から二日間「病害から稻を守りましょ」と呼びかけ始めた。

害虫対策 □二花い虫□ 化期は平坦地に病害が発生する毎年、約二千町歩が平均一二割被害を受けており、今年は昨年よりや多く見込み。一化期は六月中旬頃から発生して、これまで書生の王である、通防除がめ大切。防除法はホリドール、バチオニン乳剤一千倍液反覆り五一六斗、ホリドール BHC 三%弱剤三四%を散布する。

▼不名ハマキ毎年平坦地七百二十町歩に発生して、平均一割が被害を受けている。八月田舎で発生率が高くなる。ホリドール BHC 水利剤。

▼イナセ虫△平地帯に多発、年々開発する。毎年百七十町歩に平均五六十倍の被害を受けている。

●害虫対策 □二花い虫□ 化期は平坦地に病害が発生する毎年、約二千町歩が平均一二割被害を受けており、今年は昨年よりや多く見込み。一化期は六月中旬頃から発生して、これまで書生の王である、通防除がめ大切。防除法はホリドール、バチオニン乳剤一千倍液反覆り五一六斗、ホリドール BHC 三%弱剤三四%を散布する。

●害虫対策 □二花い虫□ 化期は平坦地に病害が発生する毎年、約二千町歩が平均一二割被害を受けており、今年は昨年よりや多く見込み。一化期は六月中旬頃から発生して、これまで書生の王である、通防除がめ大切。防除法はホリドール、バチオニン乳剤一千倍液反覆り五一六斗、ホリドール BHC 三%弱剤三四%を散布する。

●害虫対策 □二花い虫□ 化期は平坦地に病害が発生する毎年、約二千町歩が平均一二割被害を受けており、今年は昨年よりや多く見込み。一化期は六月中旬頃から発生して、これまで書生の王である、通防除がめ大切。防除法はホリドール、バチオニン乳剤一千倍液反覆り五一六斗、ホリドール BHC 三%弱剤三四%を散布する。



磐城市

## 十日じけ出荷 初秋蚕

石城郡の予約米期日完了確実

## 売渡し九二・五%

石城郡の予約米期日完了確実

## 求人週報



